



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍRODOPIS

Smyslové orgány - test

8. ročník

28. 11. 2012

Autor:
Mgr. Vlasta Hlobilová

*Zpracováno v rámci projektu „Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století“
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443*

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Informace o projektu

Název projektu: Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Příjemce: Základní škola, Přerov, Želatovská 8

Anotace:

Materiál bude sloužit k zopakování základních vědomostí o smyslových orgánech lidského těla.

SMYSLOVÉ ORGÁNY

1) Receptory zraku nejsou:

- a) tyčinky b) blizny c) čípky

2) Rohovka je

- a) průhledná b) bílá c) různě zbarvená podle pigmentu

3) Místo nejostřejšího vidění je

- a) slepá skvrna b) žlutá skvrna c) bílá skvrna

4) Zornice je otvor v

- a) rohovce b) cévnatce c) duhovce

5) Vnitřní stranu víček pokrývá tenká blanka

- a) spojivka b) spojka c) rozdělká

6) Vnější a střední ucho odděluje

- a) cimbálek b) tympánek c) bubínek

7) Mezi středoušní kůstky nepatří

- a) kladívko b) kovádlínka c) řemínek

8) Na bocích jazyka jsou chuťové pohárky pro vnímání

- a) kyselosti b) slanosti c) hořkosti

9) Při trvalejším působení určitého pachu je vnímání tohoto pachu

- a) výraznější b) slabší c) stále stejné

10) Receptory pro vnímání teploty a bolesti jsou v pokožce rozmístěny

- a) velmi různě b) sporadicky c) v pravidelných rozestupech

ŘEŠENÍ TESTU:

1) Receptory zraku nejsou:

- a) tyčinky b) blizny c) čípky

2) Rohovka je

- a) průhledná b) bílá c) různě zbarvená podle pigmentu

3) Místo nejostřejšího vidění je

- a) slepá skvrna b) žlutá skvrna c) bílá skvrna

4) Zornice je otvor v

- a) rohovce b) cévnatce c) duhovce

5) Vnitřní stranu víček pokrývá tenká blanka

- a) spojivka b) spojka c) roždělka

6) Vnější a střední ucho odděluje

- a) cimbálek b) tympánek c) bubínek

7) Mezi středoušní kůstky nepatří

- a) kladívko b) kovádlíka c) řemínek

8) Na bocích jazyka jsou chuťové pohárky pro vnímání

- a) kyselosti b) slanosti c) hořkosti

9) Při trvalejším působení určitého pachu je vnímání tohoto pachu

- a) výraznější b) slabší c) stále stejné

10) Receptory pro vnímání teploty a bolesti jsou v pokožce rozmístěny

- a) velmi různě b) sporadicky c) v pravidelných rozestupech